

# KIŚCIEC ANNAMSKI

łac. *Lophura edwardsi*, Oustalet, 1896



## WYSTĘPOWANIE

środkowy Wietnam

## POKARM

nasiona, ziarna, owady, drobne kręgowce, zielone części roślin, owoce



ok. 65 cm  
22-24 cm  
ok. 1,1 kg



SAMIEC MÄNNCHEN/MALE

DŁUGOŚĆ CIAŁA KÖRPERLÄNGE/BODY LENGTH  
DŁUGOŚĆ SKRZYDŁA FLÜGELLÄNGE/WING LENGTH  
MASA CIAŁA KÖRPERGEWICHT/BODY WEIGHT

ok. 58 cm  
21-22 cm  
ok. 1,05 kg



SAMICA WEIBCHEN/FEMALE



### (PL) KIŚCIEC ANNAMSKI

Zamieszkuje wschodnie zbocza górskie Wietnamu, porośnięte gęstymi lasami, z ograniczonym nasłonecznieniem, na wys. do 600 m n.p.m. Przez kilkadziesiąt lat był uważany za wymarły, jednak został ponownie odkryty w 2000 r. w lasach środkowego Wietnamu. Europejskie ogrody zoologiczne realizują dla tego bażanta Europejski Program Ochrony Zwierząt (EEP) w ramach Europejskiego Stowarzyszenia Ogrodów Zoologicznych i Akwariów (EAZA).

### (DE) EDWARDSFASAN

Er bewohnt östlichen Berghänge Vietnams auf einer Höhe von bis zu 600 m ü.M., die mit dichten Wäldern bewachsen sind und wo die Besonnung begrenzt ist. Über mehrere Jahrzehnte galt der Edwardsfasan als ausgestorben, wurde jedoch im Jahr 2000 im Dickicht der Wälder in Zentralvietnam erneut entdeckt. Europäische Tierparks realisieren für diesen Fasan das Europäische Erhaltungszuchtprogramm (EEP) im Rahmen des European Association of Zoos and Aquaria (EAZA).

### (EN) EDWARDS'S PHEASANT

Inhabits eastern mountain slopes of Vietnam at an altitude of up to 600 m above sea level, overgrown with dense forests, where the amount of sunshine is limited. For a number of decades the Edwards's pheasant was considered to be extinct, but it was rediscovered in 2000 in the thicket of forests in central Vietnam. European zoological gardens are implementing for this pheasant the European Endangered Species Programme (EEP) as a part of the European Association of Zoos and Aquaria (EAZA).