

KIŚCIEC TAJWAŃSKI

łac. *Lophura swinhoii*, Gould, 1863



WYSTĘPOWANIE

centralna część wyspy Tajwan



POKARM

nasiona, zielone części roślin, jagody, owady i dżdżownice

ok. 79 cm
25-26 cm
ok. 1,1 kg



SAMIEC MÄNNCHEN/MALE

DŁUGOŚĆ CIAŁA KÖRPERLÄNGE/BODY LENGTH
DŁUGOŚĆ SKRZYDŁA FLÜGELLÄNGE/WING LENGTH
MASA CIAŁA KÖRPERGEWICHT/BODY WEIGHT

ok. 50 cm
24-24,5 cm
ok. 1,1 kg



SAMICA WEIBCHEN/FEMALE



(PL) KIŚCIEC TAJWAŃSKI

Zamieszkuje gęste lasy często rosnące na zboczach, położone na wys. 300-2300 m n.p.m. Z ostatnich obserwacji wynika, że trudno go spotkać poniżej 1000 m n.p.m., co spowodowane jest wycinką lasów do tej wysokości, w związku z czym zanikają naturalne siedliska. W 1966 r. gatunek był bliski wymarcia, w środowisku naturalnym pozostało ok. 200 osobników. Wzrost liczebności do ok. 10 tys. szt. to skutek wprowadzenia obszarów chronionych oraz reintrodukcji.

(DE) SWINHOFESAN

Er lebt in dichten, oft an Berghänge wachsenden Wäldern auf einer Höhe von 200-2300 m ü.M. Neuere Beobachtungen zeigen jedoch, dass er jetzt unter 1000 m ü.M. kaum getroffen wird, was durch Abholzung bis zu dieser Höhe verursacht ist, und daher verschwinden die natürlichen Lebensräume von dieser Spezies. Im 1966 war diese Art von Aussterben bedroht, in der natürlichen Umwelt blieben nur ca. 200 Individuen. Die Erhöhung der Zahl auf etwa 10 000 ist auf die Einführung von Schutzgebieten und die Wiedereinführung zur Natur zurückzuführen.

(EN) SWINHOE'S PHEASANT

It inhabits dense forests, often ones that lie on mountainsides, at a height of 200-2300 m above sea level. Recent observations show that it is unlikely to meet the Swinhoe's pheasant under 1000 m above sea level, which is caused by the felling of forests up to this altitude. In 1966 the species was close to extinction, with about 200 individuals remaining in the wild. The increase to about 10,000 specimens is the result of the introduction of protected areas and reintroduction of the bird to the wild.