


# KRASKA

łac. *Coracias garrulus*, Linnaeus, 1758




## WYSTĘPOWANIE

środkowa, wschodnia i południowa Europa, północno-zachodnie wybrzeże Afryki; zimuje w Afryce na południe od równika

## POKARM

chrząszcze, świerszcze, szarańczaki, żuki gnojowe, dżdżownice, żaby, jaszczurki, małe węże, młode ptaki



31-35 cm

62-72 cm

0,12-0,15 kg



SAMIEC MÄNNCHEN/MALE

DŁUGOŚĆ CIAŁA KÖRPERLÄNGE/BODY LENGTH  
ROZPIĘTOŚĆ SKRZYDEŁ FLÜGELSPANNWEITE/WINGSPAN  
MASA CIAŁA KÖRPERGEWICHT/BODY WEIGHT

31-35 cm

62-72 cm

0,12-0,15 kg



SAMICA WEIBCHEN/FEMALE



### (PL) KRASKA

Zamieszkuje suche, ciepłe, otwarte tereny z pojedynczymi drzewami, zagajnikami lub luźnymi lasami, obfitującymi w duże owady naziemne (żuki, pasikoniki itp.). Gniazdo zakłada zwykle w dziupli po dzieciole czarnym lub w naturalnych otworach spróchniałych drzew liściastych. Chętnie zajmuje również odpowiedniej wielkości budki lęgowe. W Polsce liczebność kraski ciągle spada, na wschodzie naszego kraju zostało zaledwie kilkanaście par. Przyczyna tego stanu rzeczy tkwi w zmianie krajobrazu rolniczego, likwidacji zadrzewień śródpolnych i w wycianiu starych, dziuplastych drzew.

### (DE) BLAURACKEDIE

Sie lebt in trockenen, warmen, offenen Gebieten mit einzelnen Bäumen, Gehölz oder lockeren Wäldern, die reich an großen Bodeninsekten (Käfer, Heupferde usw.) sind. Die Blauracke nistet normalerweise in Nisthöhlen des Schwarzspechtes oder in den natürlichen Löchern von verfaultenen Laubbäume. Bereitwillig besetzt sie auch Nistkästen von entsprechender Größe. In Polen sinkt ihre Zahl ständig, im Osten dieses Landes gibt es nur etwa ein Dutzend Paare. Der Grund dafür ist die Veränderung der Agrarlandschaft, die Beseitigung von Ackerrandstreifen und das Fällen von alten, hohlen Bäumen.

### (EN) EUROPEAN ROLLER

It inhabits dry, warm, open areas with single trees, groves and loose forests, rich in large ground insects (beetles, grasshoppers, etc.). The European roller usually nests in a black woodpecker's hollow or in naturally existing holes in rotten broadleaf trees, and willingly takes up nest boxes of appropriate size. In Poland their number is constantly decreasing, in the eastern part of this country only over a dozen pairs remain. The reason for this lies in the change of agricultural landscape, liquidation of buffer strips and cutting down of old, hollow trees.