


KULON

łac. *Burhinus oedicnemus*, Linnaeus, 1758



WYSTĘPOWANIE

południowo-zachodnia i wschodnia Europa, Bałkany, Kaukaz, północna Afryka i środkowa Azja



POKARM

owady, pasikoniki, chrząszcze, drobne ślimaki, dżdżownice

40-45 cm
75-85 cm
0,35-0,5 kg



SAMIEC MÄNNCHEN/MALE

DŁUGOŚĆ CIAŁA KÖRPERLÄNGE/BODY LENGTH
ROZPIĘTOŚĆ SKRZYDEŁ FLÜGELSPANNWEITE/WINGSPAN
MASA CIAŁA KÖRPERGEWICHT/BODY WEIGHT

40-45 cm
75-85 cm
0,35-0,5 kg



SAMICA WEIBCHEN/FEMALE



(PL) KULON

Kulony zamieszkują nieużytki, piaszczyste wydmy, wrzosowiska, oraz suche, porośnięte ubogą roślinnością tereny sąsiadujące ze starorzeczami. Najbardziej aktywne są od zmierzchu do świtu, ale aktywność w ciągu dnia też nie należy do rzadkości, choć łatwiej je usłyszeć niż zobaczyć. Gniazda zakładają w płytkich zagłębieniach w ziemi, w miejscach otwartych oraz ubogich w roślinność, zapewniających dobrą obserwację otoczenia. W Polsce do niedawna był to gatunek lęgowy.

(DE) TRIEL

Er bewohnt Ödländer, Sanddünen, Heiden, sowie trockene Gebiete mit lichter Vegetation, die an Altwasserseen liegen. Er ist von der Abenddämmerung bis zum Morgengrauen am aktivsten, aber Tätigkeit während des Tages ist auch keine Seltenheit, obwohl er leichter zu hören als zu sehen ist. Das Nest baut er in flachen Senkungen im Boden an offenen und Vegetationssarmen Orten, die gute Beobachtung der Umgebung gewährleisten. Bis vor kurzem war es eine Brutart in Polen.

(EN) EURASIAN STONE-CURLEW

The Eurasian stone-curlew inhabits wastelands, dunes, heath, as well as dry areas with little vegetation by oxbow lakes. It is mostly active from dusk to dawn, but daytime activity is also not uncommon, although the bird is easier heard than seen. The Eurasian stone-curlew builds nests in shallow depressions in the ground, in open places with poor vegetation providing good observation of the surroundings. Until recently, it was a breeding species in Poland.