

USZAK BIAŁY

łac. *Crossoptilon crossoptilon*, Hodgson, 1838



WYSTĘPOWANIE

od wschodniego Tybetu do południowo-zachodniego Junnanu, zachodni Syczuan, południowy Qinghai

POKARM

bulwy, korzonki, nasiona, owady i ich larwy, jagody, różne części roślin, młoda kora



86-96 cm

27,2-39,5 cm

2,35-2,75 kg



SAMIEC MÄNNCHEN/MALE

DŁUGOŚĆ CIAŁA KÖRPERLÄNGE/BODY LENGTH

DŁUGOŚĆ SKRZYDŁA FLÜGELLÄNGE/WING LENGTH

MASA CIAŁA KÖRPERGEWICHT/BODY WEIGHT

86-96 cm

26,5-30,8 cm

1,45-2,05 kg



SAMICA WEIBCHEN/FEMALE



(PL) USZAK BIAŁY

Występuje w wysokogórskich prześwietlonych lasach z gęstym podszytem, na wysokości 3000-4500 m n.p.m., w pobliżu źródeł wody (zimą zastępuje ją śniegiem). W okresie zimowym łączą się w większe grupy i schodzą do lasów w niższych rejonach. Tak jak wszystkie rodzaje uszaków, samce i samice ubarwione są jednakowo. W ziemi ryją tylko dziobem, który jest do tego specjalnie przystosowany (jest silny i szeroki).

(DE) WEIßER OHRFASAN

Er kommt in lichten Hochgebirgswäldern mit dichtem Unterholz vor, auf Höhen von 3000 bis 4500 m ü.M., in der Nähe von Gewässer (die im Winter durch Schnee ersetzt werden). Im Winter schließen sich weiße Ohrfasane zu größeren Gruppen und steigen in Wälder in unteren Regionen ab. Wie bei allen Arten von Ohrfasanen sind Männchen und Weibchen dieser Spezies gleich gefarbt. Sie wühlen in der Erde nur mit ihrem Schnabel, der speziell dafür angepasst ist (er ist stark und breit).

(EN) WHITE-EARED PHEASANT

It can be found in high mountain forests with dense undergrowth, at altitudes between 3000 and 4500 m above sea level, near water sources (in winter they are replaced by snow). In winter, they merge into larger bouquets and descend into forests in lower regions. As with all eared pheasants, the males and females of this species are coloured equally. They dig in the ground with their beaks only, which are specially adapted for it (they are strong and wide).